

Die Entwurmung von Pferden ist von vielerlei Faktoren abhängig, z. B. Bestandsform, Haltungsform, Weidebesatz, Altersgruppe, Weidehygiene, Witterungsverlauf und Resistenzlage.

Nicht zuletzt der Resistenzen wegen ist eine nicht pauschalisierte Gabe von Wurmkuren empfehlenswert, erfordert aber ein hohes Maß an Organisation und gutem Weide- und Futtermanagement. Mit dem Vorgehen des sogenannten selektiven Entwurmens können keinesfalls beim Pferd Kosten gespart werden. Wer dies damit beabsichtigt, versteht die Komplexität dieser Entwurmungsmethode nicht.

Um Ihnen Anhaltspunkte zu geben, haben wir folgende Empfehlungen für Sie zusammengestellt:

1. Fohlen

<i>Behandlungszeitpunkt</i>	<i>Indikation</i>	<i>Wirkstoff</i>
2 und 4 Wochen nach Geburt	Zwergfadenwurm	Benzimidazole
2 und 5 Monate nach Geburt	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm	Pyrantel
ca. 8 Monate nach Geburt (November/Dezember)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm, Magendassel, Bandwurm	Ivermectin/Moxidectin plus Praziquantel

2. Jährlinge und Jungpferde bis 4 Jahre

<i>Behandlungszeitpunkt</i>	<i>Indikation</i>	<i>Wirkstoff</i>
1-2 Monate nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm	Ivermectin/Moxidectin
4-5 Monate nach Weideaustrieb (August/September)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm	Ivermectin/Moxidectin, Benzimidazol, Pyrantel
Bei Aufstallung (November/Dezember)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm, Magendassel, Bandwurm	Ivermectin/Moxidectin plus Praziquantel
Februar/März	Magen-Darm-Wurm	Benzimidazol, Pyrantel

3. Pferde ab 5 Jahre

<i>Behandlungszeitpunkt</i>	<i>Indikation</i>	<i>Wirkstoff</i>
1-2 Monate nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm	Ivermectin/Moxidectin
4-5 Monate nach Weideaustrieb (August/September)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm	Benzimidazol, Pyrantel
Bei Aufstallung (November/Dezember)	Spulwurm, Magen-Darm-Wurm, Magendassel, Bandwurm	Ivermectin/Moxidectin plus Praziquantel
Februar/März	Magen-Darm-Wurm	Benzimidazol, Pyrantel

4. Zuchtstuten

<i>Behandlungszeitpunkt</i>	<i>Indikation</i>	<i>Wirkstoff</i>
1-2 Tage nach dem Abfohlen	Laktogene Übertragung Zwergfadenwurm	Ivermectin/Moxidectin
Juli/August	Magen-Darm-Wurm	Benzimidazol, Pyrantel
November/Dezember	Magen-Darm-Wurm, Magendassel, Bandwurm	Ivermectin/Moxidectin plus Praziquantel

Quelle: Pferdeheilkunde 27

Einige Beispiele für handelsübliche Präparate

<i>Wirkstoff</i>	<i>Handelsname</i>
Benzimidazol	Panacur, Fenbendat
Pyrantel	Equi-Wurmpaste, Jernadex, Hippoparex, Banminth, Verminal P
Ivermectin/Moxidectin	Eraquell, Ivomec P, Animec, Equest, Diapec, Hippomectin u.a.
Ivermectin/Moxidectin plus Praziquantel	Equimax, Equalan Duo, Equest Pramox